

## **Лабораторна робота №5.**

### **ВПЛИВ РІЗНИХ ФАЗ ДИХАННЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВЛАСНЕ СИЛОВИХ І ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ВПРАВ**

**Мета роботи:** виявити значення правильної постановки дихання для показників власне силових і швидкісно-силових рухів.

**Обладнання:** динамометр (пружинний або гідралічний), місце для стрибків у довжину, рулетка.

#### **Хід роботи.**

Дослідження з динамометром проводять по двоє. Студент, який проводить дослідження, підбирає довжину ланцюжка станового динамометра за зростом обстежуваного з таким розрахунком, щоб він робив ривок тільки за рахунок розгинання спини. Руки і ноги обстежуваного мають бути розігнуті і не брати участі в силовому акті. Таким чином, досліджуваний робить максимальний ривок одночасно із вдихом, не зупиняючи дихання. Потім через 6 хв. відпочинку він повторює ривок, але вже на фазі видиху, який супроводжується звуком, без затримування дихання. Ще через 6 хв. повторюється ривок при натужуванні після глибокого вдиху. Довго і надмірно натужуватись не слід, бо це утруднює відлив крові від голови і перешкоджає легеневому кровопостачанню. Послідовність фаз дихання під час ривків може бути змінена для того, щоб виключити вплив попередніх ривків на наступні.

Ще більш показові досліди з ручним динамометром, бо м'язи – згиначі пальців та кисті не мають прямого відношення до грудної клітки.

Студент, який проводить дослідження, встановлює стрілку динамометра на нуль і вкладає прилад у руку обстежуваного шкалою донизу. Жим треба робити сидячи, під час вдиху, поклавши обидва лікті на стіл. Обстежуваний повертає динамометр, не дивлячись на його шкалу. Через 5 хв. відпочинку повторити жим у тій самій позі, але вже на фазі тривалого видиху. Ще через 5 хв. відпочинку зробити максимальний жим з натужуванням. Дослідник записує результат до таблиці. Подібний дослід проводиться за допомогою гідралічного динамометра на різних м'язах-згиначах кисті, передпліччя, гомілки.

Порівнюють результати, одержані на різних динамометрах, роблять висновки і узагальнюють їх.

Значення дихальних рухів для швидкісно-силового акту вивчається на прикладі стрибків у довжину з місця. Дослід можуть проводити два студенти на всіх інших. Один замірює стрибок, другий записує результати. Студенти стрибають у довжину з місця, намагаючись добитися кожний раз

максимального результату, спочатку на фазі вдиху, потім замірюють стрибок на фазі видиху і третій раз при натужуванні. Інтервали часу між двома підходами одного студента мають бути не менше 10 хв., щоб наступний стрибок не збігався з фазою підвищеної працездатності від попереднього.

Напруження мускулатури, яка бере участь у видиху, підвищення внутрішньо грудного тиску рефлекторно збільшують силу скелетних м'язів. Правильній постановці дихання під час розучування рухів треба приділяти особливу увагу. Під час виконання вільних рухів піднімання рук угору або розведення в сторони з випрямленням грудей та розгинанням тулуба і ніг сприяє актові вдиху. Опускання рук, згинання тулуба, присідання, згинання ніг створюють анатомічні передумови для видиху, зменшуючи об'єм грудної клітки. Але, якщо в русі є моменти великих силових чи швидкісно-силових зусиль, то вони повинні поєднуватись з видихом незалежно від того, чи відповідає при цьому поза зменшенню об'єму грудної клітки чи ні.

### **Контрольні питання.**

1. Охарактеризуйте вправи силового, швидкісного, та швидкісно-силового характеру.
2. Від яких факторів залежить прояв максимальної потужності виконання фізичної вправи?
3. Які основні фізіологічні зміни відбуваються під час вправ силового та швидкісного характеру?

### **Література**

1. Шмалей С. В. Диагностика здоровья, Херсон, 1994.- 206 с.
2. Пирогова Е.А. Совершенствование физического состояния человека. - К.: Здоров'я, 1989. – 168 с.
3. Романенко В.А. Диагностика двигательных способностей. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005. – 290 с.